A virtualized skein relation for a multivariable polynomial invariant

名古屋市立大学

開 萌実 (Hiraki Moemi) *

結び目の数理 IV 報告書

概要

Virtual link diagram の Jones 多項式に関する virtual skein relation が N.Kamada, Nakabo, Satoh によって [4] で紹介された. また Dye, Kauffman, Miyazawa が導入した virtual link の invariant である multivariable polynomial は Jones polynomial の精密化である ([1],[6]). この multivariable polynomial の almost classical virtual link に対する virtualized skein relation について報告する.

1 A multivariable polynomial invariant

1.1 Alexander numbering

以降, D を virtual link diagram とする.

ここで, D の **semi-arc** とは, 2つの classical crossing の間にある D の component, または D の classical crossing を持たない loop のことである. また, D の **Alexander numbering** とは D の各 crossing を構成する semi-arc に対しては図 1 にあるように $\mathbb{Z}$ を割り当てることである.

図 1: 各 crossing における numbering.

Alexander numbering をもつ例として以下の例 1.1 と例 1.2 がある.

例 1.1.

図 2: 三葉結び目における Alexander numbering.

例 1.2.

図 3: virtual link diagram の Alexander numbering.

* e-mail : m.hiraki@nsc.nagoya-cu.ac.jp

すべての classical link diagram は Alexander numbering を持つが, すべての virtual link diagram が Alexander numbering を持つとは限らない. 例 1.3 は Alexander numbering を持たない virtual link diagram である.

例 1.3.

図 4: Alexander numbering を持たない virtual link diagram.

ここで, virtual link diagram D が Alexander numbering を持つとき, D を **almost classical** virtual link diagram という. また, virtual link L が almost classical virtual link diagram を持つとき, L を **almost classical** virtual link という.

1.2 cut system

An **oriented cut point** とは, 図 5 のように向きにそって Alexander numbering が 1 増えるような向きを持つ semi-arc 上の point である.

図 5: An oriented cut point.

C を virtual link diagram の oriented cut point の集合とする. C を伴う D が Alexander numbering を持つとき, C を D の **cut system** という.

Virtual link diagram と cut system の例を以下に示す.

例 1.4.

図 6: Alexander numbering of a virtual link diagram with cut system.

ここで注意として, almost classical virtual link diagram の cut system として空集合がとれる.

また, **oriented cut point move** とは図7のような local な変形である.

図 7: oriented cut point move

この oriented cut point move に関して以下のことが知られている.

定理 1.5. (N.Kamada [3])

D を *virtual link diagram* とすると D の 2 つの *cut system* は有限回の *oriented cut point move* で移り合う.

1.3 A multivariable polynomial invariant

(D, C) を virtual link diagram D と D の cut system C のペアとする.

ここで, **cut point state diagram** of (D, C) とは, D の すべての classical crossing を splice して得られた, oriented cut point を持つ virtual link diagram のことである.

また ι を以下の条件を満たすような cut point state diagram の loop の集合から $\mathbb{Z}$ への写像とする.

$$(i) \ \iota \left(\begin{array}{c} \leftarrow \leftarrow \leftarrow \\ \text{.....} \\ \rightarrow \rightarrow \rightarrow \end{array} \right) = \iota \left(\begin{array}{c} \rightarrow \rightarrow \rightarrow \\ \text{.....} \\ \leftarrow \leftarrow \leftarrow \end{array} \right) = r, \text{ ここで, oriented cut point は同じ向きに } 2r \text{ 個存在する.}$$

$$(ii) \ \iota (\rightarrow \leftarrow) = \iota (\leftarrow \rightarrow) = \iota (\text{---})$$

$$(iii) \ \iota \left(\begin{array}{c} \rightarrow \oplus \text{---} \\ \text{---} \oplus \rightarrow \end{array} \right) = \iota \left(\begin{array}{c} \text{---} \oplus \rightarrow \\ \rightarrow \oplus \text{---} \end{array} \right)$$

S をすべての (D, C) の cut point state diagrams の集合としたとき, $\langle\langle D, C \rangle\rangle$ を以下のように定義する.

$$\langle\langle D, C \rangle\rangle := \sum_{\sigma^c \in S} A^{\sharp \sigma^c} (-A^2 - A^{-2})^{\# \sigma^c - 1} d_1^{\tau_1(\sigma^c)} d_2^{\tau_2(\sigma^c)} \dots \in \mathbb{Z}[A^{\pm 1}, d_1, d_2 \dots]$$

ここで $\sharp \sigma^c := (\sigma^c \text{ の } A \text{ - splice の数}) - (\sigma^c \text{ の } B \text{ - splice の数})$

$\# \sigma^c := (\sigma^c \text{ の loop の数})$

$\tau_i(\sigma^c) := (\iota(l) = i \text{ となる } \sigma^c \text{ の loop } l \text{ の数})$

である.

この $\langle\langle D, C \rangle\rangle$ に対して以下のことが知られている.

命題 1.6. (N.Kamada [2])

$\langle\langle D, C \rangle\rangle$ は C の選択に依らない.

命題 1.6 より, 以降 $\langle\langle D, C \rangle\rangle$ を $\langle\langle D \rangle\rangle$ と書く.

このとき, D の multivariable polynomial X_D を以下のように定義する.

$$X_D := (-A^3)^{-w(D)} \langle\langle D \rangle\rangle$$

$w(D) = (D \text{ の positive crossing の数}) - (D \text{ の negative crossing の数})$

この multivariable polynomial X_D について以下のことがわかっている.

定理 1.7. (N.Kamada [2])

X_D は Dye, Kauffman, Miyazawa の定義された *multivariable polynomial invariant* と一致する.

命題 1.8. (Nakamura, Nakanishi, Satoh [5], N.Kamada [2])

D が *almost classical virtual link diagram* のとき, $X_D \in \mathbb{Z}[A^{\pm 1}]$ となる.

2 主結果と応用

2.1 主結果

virtual skein triple (D_+, D_-, D_v) とは, D_+ の positive crossing p を交差交換したものを D_- , D_+ の p を virtual crossing に変えたものを D_v とした virtual link diagrams の三対のことである.

V_D を virtual link diagram D の Jones 多項式とする. N.Kamada, Nakabo, Satoh が [4] において Jones 多項式に対して次の関係を示した.

定理 2.1. (N.Kamada, Nakabo, Satoh [4])

(D_+, D_-, D_v) を *virtual skein triple* とする.

D_+, D_- が *checkerboard colorable virtual link diagram* のとき以下の式が成り立つ.

$$A^3 V_{D_+} + A^{-3} V_{D_-} = (A^3 + A^{-3}) V_{D_v}$$

以下の定理 2.2 が主結果である.

定理 2.2. (D_+, D_-, D_v) を *virtual skein triple* とし,

D_+, D_- が *almost classical virtual link diagram* のとき以下の式が成り立つ.

$$(A^6 - d_1) X_{D_+} + (-A^{-6} + d_1) X_{D_-} = (A^6 - A^{-6}) X_{D_v}$$

証明. D_+, D_- は almost classical virtual link diagram であるので, D_+, D_- の cut system として空集合をとる. このとき, D_v は図 8 のように 2 つの oriented cut point だけを持つような cut system を持ち, D_v はそのような cut system をとるとする.

図 8: virtual skein triple における cut system

S_+, S_-, S_v をそれぞれ D_+, D_-, D_v の全ての state の集合とする.

ここで, D が almost classical virtual link diagram ならば, D は checkerboard colorable であるから, $S_{\pm}$ は図 9 にあるような arc のつながり方をしている cut point state の集合 $S'_{\pm}$ と $S''_{\pm}$ の非交和 $S_{\pm} = S'_{\pm} \sqcup S''_{\pm}$ である. よって, S_v は図 9 にあるような S_v の部分集合 S'_v と S''_v の非交和 $S_v = S'_v \sqcup S''_v$ である.

図 9:

ここで, state の部分集合 S' に関して,

$$\langle\langle D|S' \rangle\rangle := \sum_{\sigma^c \in S'} A^{|\sigma^c|} (-A^2 - A^{-2})^{\#\sigma^c - 1} d_1^{r_1(\sigma^c)} d_2^{r_2(\sigma^c)} \dots \in \mathbb{Z}[A^{\pm 1}, d_1, d_2, \dots] \text{ とおく.}$$

以下が成立する.

$$\begin{aligned} \langle\langle D_+|S'_+ \rangle\rangle &= A(-A^2 - A^{-2}) \langle\langle D_v|S'_v \rangle\rangle + A^{-1} \langle\langle D_v|S'_v \rangle\rangle \\ &= -A^3 \langle\langle D_v|S'_v \rangle\rangle. \end{aligned} \quad (2.1)$$

$$\text{同様に, } \langle\langle D_-|S'_- \rangle\rangle = -A^{-3} \langle\langle D_v|S'_v \rangle\rangle. \quad (2.2)$$

また,

$$\begin{aligned} d_1 \langle\langle D_+|S''_+ \rangle\rangle &= (A + A^{-1}(-A^2 - A^{-2})) \langle\langle D_v|S''_v \rangle\rangle \\ &= -A^{-3} \langle\langle D_v|S''_v \rangle\rangle. \end{aligned} \quad (2.3)$$

$$\text{同様に, } d_1 \langle\langle D_-|S''_- \rangle\rangle = -A^3 \langle\langle D_v|S''_v \rangle\rangle. \quad (2.4)$$

式 (2.1), 式 (2.2), 式 (2.3), 式 (2.4) を用いると,

$$\begin{aligned} &(-A^3 + A^{-3}d_1) \langle\langle D_+ \rangle\rangle - (-A^{-3} + A^3d_1) \langle\langle D_- \rangle\rangle \\ &= (-A^3 + A^{-3}d_1)(\langle\langle D_+|S'_+ \rangle\rangle + \langle\langle D_+|S''_+ \rangle\rangle) - (-A^{-3} + A^3d_1)(\langle\langle D_-|S'_- \rangle\rangle + \langle\langle D_-|S''_- \rangle\rangle) \\ &= (-A^3 + A^{-3}d_1)(-A^3 \langle\langle D_v|S'_v \rangle\rangle - A^{-3}d_1^{-1} \langle\langle D_v|S''_v \rangle\rangle) - (-A^{-3} + A^3d_1)(-A^{-3} \langle\langle D_v|S'_v \rangle\rangle - A^3d_1^{-1} \langle\langle D_v|S''_v \rangle\rangle) \\ &= (A^6 - A^{-6})(\langle\langle D_v|S'_v \rangle\rangle + \langle\langle D_v|S''_v \rangle\rangle) \\ &= (A^6 - A^{-6}) \langle\langle D_v \rangle\rangle. \end{aligned} \quad (2.5)$$

ここで, $w(D_+) = w(D_v) + 1$, $w(D_-) = w(D_v) - 1$ であるので, 式 (2.5) より主結果である式 (2.6) が得られる.

$$(A^6 - d_1)X_{D_+} + (-A^{-6} + d_1)X_{D_-} = (A^6 - A^{-6})X_{D_v}. \quad (2.6)$$

□

2.2 応用

ここでは先ほどの定理の応用を2つ挙げる.

系 2.3.

D_+, D_- が *almost classical virtual link diagram* のとき, $X_{D_v} \in \mathbb{Z}[A^{\pm 1}, d_1]$ となる.

ここで, $\text{Exp}(X_D)$ を X_D の d_i を含まない項の A の指数の集合とし, $\text{Exp}(X_D|d_i)$ を X_D の d_i を含む項の A の指数の集合とする. このとき以下のことがわかる.

系 2.4. (Satoh, Tomiyama [7])

(D_+, D_-, D_v) を *virtual skein triple*,

D_+, D_- を n 成分の *almost classical virtual link diagram* としたとき以下が成り立つ.

$$\text{Exp}(X_{D_v}) \subset \begin{cases} 4\mathbb{Z} & (n : \text{odd}) \\ 4\mathbb{Z} + 2 & (n : \text{even}) \end{cases}$$

$$\text{Exp}(X_{D_v}|d_1) \subset \begin{cases} 4\mathbb{Z} + 2 & (n : \text{odd}) \\ 4\mathbb{Z} & (n : \text{even}) \end{cases}$$

図 10:

具体例として図 10 を計算すると multivariable polynomial invariant はそれぞれ以下のようになる.

$$X_{D_+} = A^8 - A^4 + 1 - A^{-4} + A^{-8}$$

$$X_{D_-} = 1$$

$$X_{D_v} = A^8 - A^4 + 1 + (-A^2 + A^{-2})d_1$$

この計算結果は, 系 2.3 と 系 2.4 を満たしていることがわかる.

参考文献

- [1] H. A. Dye and Louis H. Kauffman, *Virtual Crossing Number and the Arrow Polynomial* (2009), available at 0810.3858.
- [2] N.Kamada, *A multivariable polynomial invariant of virtual links and cut systems*, *Topology and its Applications* **301** (2021), 107518, DOI <https://doi.org/10.1016/j.topol.2020.107518>. Special issue for the proceedings of the Third PPICTA.
- [3] N.Kamada, *Cyclic coverings of virtual link diagrams* (2019), available at 1903.03306.
- [4] N.Kamada and Nakabo and Sato, *A virtualized skein relation for Jones polynomials*, *Illinois Journal of Mathematics - ILL J MATH* **46** (2002), DOI 10.1215/ijm/1258136203.
- [5] Y. Miyazawa, *A multi-variable polynomial invariant for virtual knots and links*, *Journal of Knot Theory and its Ramifications* **17** (2008), no. 11, 1311-1326, DOI 10.1142/S0218216508006658. cited By 34.
- [6] Nakamura and Nakanishi and Sato and Tomiyama, *Twin groups of virtual 2-bridge knots and almost classical knots*, *Journal of Knot Theory and its Ramifications* **10** (2012), DOI 10.1142/S0218216512500952.
- [7] Sato and Tomiyama, *On the crossing numbers of a virtual knot*, *Proceedings of the American Mathematical Society* **140** (2012), DOI 10.1090/S0002-9939-2011-10917-1.